



CUIDADO POST OPERATORIOS DE OTOPLASTIA

ES NORMAL:

- Dolor de leve a moderado. En caso de que el dolor aumente, avisar.
- Sensación de disminución de la sensibilidad y/o hormigueo en la oreja, que irá desapareciendo progresivamente.
- Equimosis (moratones) y edema, los cuales irán disminuyendo paulatinamente a partir de la primera semana y desaparecerán, los primeros, en dos o tres semanas y, el edema, más lento, al cabo de un mes será mínimo.

DEBE SABER QUE:

- Después de la Cirugía se coloca un vendaje compresivo que será revisado en las primeras 24 horas, y se retirará en el primer control, luego dejamos un leve apósito o una cinta del pelo tipo tenista que se mantendrá durante 1 mes.
- Los puntos habitualmente se absorben solos.
- El resultado definitivo no puede ser valorado hasta los tres meses de la intervención debido a edema.

ES IMPORTANTE:

- Evitar mojar los apósitos mientras no se retiren. Después se lavará todos los días las orejas, y en especial las cicatrices, con agua y jabón neutro, secando la zona con aire frío.
- Los niños deberán evitar todo movimiento, juego o deporte que pueda poner en riesgo el tratamiento. Especialmente durante las siguientes cuatro semanas.
- Existe la posibilidad de que el paciente experimente picazón o comezón en el sitio de la cirugía.
- Esta sensación es efecto de la resequead que sufren las suturas en el postoperatorio. Es muy importante que los padres del paciente niño eviten que éste se frote o rasque la zona operada.
- La ruptura de las suturas puede significar un daño grave a lo que se ha alcanzado en la reconstrucción, así como conducir a infecciones y otras complicaciones.
- Dormir o descansar con la cabeza y la espalda ligeramente elevadas, evitando posiciones laterales.
- Utilizar la cinta, tanto de día como de noche, durante las primeras semanas, retirándola sólo durante breves períodos de tiempo para descansar de la presión constante.
- La sensación pasajera de zumbido es un efecto de la cirugía, que se debe a la cercanía de la intervención al oído. Esta sensación debe ceder con los días y puede ser aliviada con medicación.